

## Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite Rapport de situation mensuel – septembre 2008

Données au 30 septembre 2008 Pour les informations détaillées et les derniers chiffres concernant les cas de poliomyélite par pays mis à jour chaque semaine :: [www.polioeradication.org](http://www.polioeradication.org)

### HEADLINES

**Des collaborateurs de la lutte contre la poliomyélite tués en service commandé** *L'attaque survenue dans le sud de l'Afghanistan rappelle les dangers encourus par les agents de santé publique:* Le 14 septembre, deux médecins travaillant pour l'OMS et leur chauffeur ont perdu la vie dans une attaque suicide à la voiture piégée dans la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Le Dr Shamsul Haq MH Kakar, le Dr Mamoon Taher Taheri et leur chauffeur Azizullah Almas, de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, étaient en route pour préparer la logistique en vue d'une campagne de vaccination prévue pour la fin septembre dans la région lorsque leur convoi a été attaqué. Ce tragique incident, de même que l'attaque armée qui s'est produite en Somalie cet été et dans laquelle ont été tués deux collaborateurs de la lutte contre la poliomyélite, rappellent avec force les risques encourus par ceux qui travaillent pour la santé publique dans de nombreuses parties du monde. Au cours des 20 ans d'existence de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, les vaccinateurs et autres

membres du personnel ont couru le risque d'être tués, agressés, enlevés ou victimes de catastrophes naturelles sur tous les continents, malgré les mesures de sécurité prises par les Nations Unies. Ces travailleurs sont en grande majorité des volontaires; presque tous - employés et volontaires - vivent et travaillent dans des zones reculées ou défavorisées, pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à la vaccination.

Le Secrétaire général des Nations Unies a condamné la récente attaque dans les termes les plus vifs qui soient. En hommage aux victimes, les campagnes de vaccination qu'elles étaient en train de préparer n'ont pas été annulées.

Le Fonds pour les héros de l'éradication de la poliomyélite rend hommage aux agents de santé et volontaires qui ont été grièvement blessés ou tués en raison de leur participation aux activités d'éradication de la poliomyélite. Les familles des travailleurs reçoivent un certificat mentionnant l'engagement héroïque de la victime en faveur de l'éradication de la poliomyélite ainsi qu'une somme d'argent. Ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire en ligne ou s'adresser à Polio Eradication Heroes Fund, CDC Foundation, 50 Hurt Plaza - Suite 765, Atlanta, GA 30303, Etats-Unis d'Amérique.

### PAYS ENDEMIQUES

#### Inde

- En 2008, 449 cas ont été signalés (38 de type 1 et 411 de type 3).
- La priorité absolue est d'enrayer la flambée de poliovirus de type 1 à l'ouest de l'Uttar Pradesh. Exempt de poliovirus de type 1 pendant plus de 12 mois, les principaux districts à haut risque de l'ouest de l'Uttar Pradesh ont connu récemment une propagation locale de ce virus importé à l'origine du Bihar.
- Une série de campagnes de ratissage énergiques à l'aide du vaccin antipoliomyélitique oral monovalent de type 1 (mOPV1) continue dans tout l'Uttar Pradesh, avec un appui technique intense et renforcé dans les districts les plus à risque l'ouest de l'Uttar Pradesh.
- Au Bihar, une série de campagnes de rattrapage se poursuit afin de renforcer d'urgence l'immunité de la population qui peut avoir baissé à la suite des graves inondations qui ont récemment affecté cet état. Une campagne qui devait se dérouler dans tout l'état le 14 septembre a été reportée au 28 septembre en raison de nouvelles inondations.
- L'interruption de la transmission du poliovirus de type 1 cette année en Inde reste un objectif stratégique prioritaire de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Pour réussir, il s'agit avant tout de maintenir l'élan politique qui a conduit l'Inde si près de l'éradication du poliovirus de type 1

#### Nigéria

- En 2008, 692 cas ont été signalés (638 de type 1, 53 de type 3 et 1 cas de co-infection de types 1 et 3).
- Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l'OMS, a attiré l'attention des dirigeants africains sur le risque que représente la flambée actuelle en Afrique, lors de la récente réunion du Comité régional pour l'Afrique à Yaoundé, au Cameroun. S'adressant aux ministres africains de la santé, le Dr Chan a

déclaré : "Les pays d'Afrique sont de nouveau exposés à la poliomyélite. La souche la plus dangereuse de cette maladie affecte les provinces du nord du Nigéria. Et cette flambée a déjà commencé à se propager aux pays voisins."

- L'épicentre de la flambée de poliovirus de type 1 reste l'état de Kano, qui supporte un tiers de la charge mondiale en 2008.
- Des écarts de couverture vaccinale importants - en raison de problèmes opérationnels - persistent durant les campagnes contre la poliomyélite dans les états les plus à risque du nord du Nigéria, où jusqu'à 60% des enfants restent sous ou non immunisés (trois doses ou moins, dans certains états, comme à Kano). Plus de 75% de tous les cas enregistrés cette année l'ont été dans les six états les plus à risque du nord (Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina et Zamfara).
- Afin de combler cette lacune, il est capital de traduire d'urgence les engagements nationaux au plus haut niveau en améliorations concrètes des opérations sur le terrain. Les activités les plus récentes mises sur pied en août ont continué à être affectées par des problèmes opérationnels significatifs.
- Un calendrier d'activités de vaccination supplémentaires (AVS) pour la fin de l'année en cours est en train d'être élaboré.

#### Pakistan et Afghanistan

- En 2008, 67 cas ont été signalés au Pakistan (50 de type 1 et 17 de type 3) et 20 cas en Afghanistan (15 de type 1 et 5 de type 3).
- En Afghanistan, une journée de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu le 21 septembre dans le cadre de la Journée internationale de la Paix, pour vacciner plus de 1,8 million d'enfants de moins de cinq ans. L'OMS et l'UNICEF ont appelé publiquement toutes les factions et communautés à permettre le passage en toute sécurité et partout des vaccinateurs. Des déclarations publiques répondant à cet appel, notamment de la part d'éléments anti-gouvernementaux, ont

apporté leur appui à l'éradication de la poliomyélite et aux campagnes de vaccination.

- Cette dernière campagne de vaccination s'est déroulée comme prévu, malgré des événements tragiques récents (voir le titre « Faits marquants » ci-dessus).
- Au Pakistan, en réponse à la récente augmentation et à la propagation géographique des cas de poliomyélite, une campagne supplémentaire de grande envergure a été menée du 15 au 17 septembre dans les zones à haut risque de la Province de la Frontière du nord-ouest, au Baloutchistan, au Punjab et à Islamabad, pour atteindre plus de 28 millions d'enfants de moins de cinq ans.
- Le 10 octobre, une consultation d'urgence se tiendra à EMRO

dans le but de passer en revue la situation épidémiologique et de discuter des nouvelles façons de l'aborder.

- En raison de l'accroissement récent de l'insécurité dans certaines zones du pays et des mouvements de populations qui en résultent, les zones exemptes de poliomyélite restent exposées au risque de réinfection. Le Punjab, qui était exempt de poliomyélite, connaît actuellement une nouvelle flambée.
- Afin d'accroître encore l'immunité de la population dans tout le pays, le nombre de Journées nationales de vaccination (JNV) sera augmenté. Les Journées locales de vaccination (JLV) prévue en octobre deviendront des JNV à part entière.
- Ces JNV revêtiront une importance cruciale, particulièrement dans les zones réinfectées du Punjab et à Islamabad. Dans le Sindh, l'accent sera mis sur le comblement urgent des lacunes opérationnelles en matière de qualité des campagnes.

## P A Y S R E I N F E C T É S

### Angola

- En 2008, 25 cas ont été signalés (2 de type 1 et 23 de type 3). La récente confirmation d'un cas de type 3 dans la province précédemment exempte de Moxico dans l'est du pays est révélatrice d'une transmission géographiquement étendue de ce sérotype. Les efforts doivent être renforcés pour éviter la réinfection des pays voisins, notamment la Zambie (qui est exempte de poliomyélite).
- La riposte à cette flambée continue. Une campagne de ratissage à l'aide de VPO monovalent de type 3 a eu lieu du 26 au 28 septembre dans les districts à haut risque, une campagne de ratissage nationale avec le VPOM1 étant prévue du 24 au 26 octobre. En outre, le pays organise sur le plan national des "activités de vaccination systématique accélérée" en novembre et en décembre. Au cours de ces activités, une série de vaccins - notamment le VPO trivalent - seront offerts aux communautés en utilisant une approche fondée sur des sites de vaccination fixe.

### République centrafricaine (RCA)

- En 2008, deux cas ont été signalés (tous les deux de type 1). Deux campagnes nationales ont été mises sur pied dont la dernière a eu lieu le 19 septembre et d'autres campagnes sont prévues.
- Le risque d'importations supplémentaires tant du Tchad (au nord) que de la République démocratique du Congo (au sud) reste élevé.

### Tchad

- En 2008, 21 cas ont été signalés (un de type 1 et 20 de type 3).
- Le risque d'une nouvelle propagation internationale tant à l'intérieur du Tchad que vers l'extérieur est élevé. Cette année, la flambée s'est déjà étendue au Soudan voisin. La transmission de la poliomyélite est largement répandue dans tout le pays et même si tous les cas enregistrés cette année sont de type 3, on ne peut exclure que des cas de type 1 n'aient pas été détectés, compte tenu des lacunes qui existent dans la surveillance au niveau subnational.
- Aussi bien l'ampleur que la qualité des activités de riposte à la flambée au Tchad sont inadéquates. Près de 40% des enfants n'ont pas été couverts par les plus récentes campagnes de vaccination du mois d'août dans les zones clés.
- Il faut davantage d'engagement et d'appropriation politique au niveau le plus élevé et sur le plan local pour faire face à cette flambée.

### République démocratique du Congo

- Quatre cas ont été signalés cette année (tous de type 1).
- Des activités de riposte aux flambées à grande échelle se poursuivent. En septembre, le VPO a été ajouté à une campagne de vaccination contre la rougeole et d'autres activités sont prévues.

### Afrique de l'Ouest

- En Afrique de l'Ouest, 16 cas ont été signalés cette année (deux au Bénin, un au Burkina Faso et 13 au Niger).
- L'Afrique de l'Ouest reste sous la menace de cas importés en raison de sa proximité avec les zones endémiques du Nigéria.
- A la suite de deux campagnes synchronisées dans les zones frontalières avec le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger en juin et en juillet, une troisième aura lieu en octobre.

### Corne de l'Afrique

- Sept cas ont été signalés dans la Corne de l'Afrique cette année (six dans la zone frontalière sud du Soudan/ouest de l'Éthiopie et un cas dans l'ouest du Darfour au Soudan).
- En octobre et en novembre une stratégie de riposte énergique à la flambée se poursuivra par des campagnes synchronisées dans la zone frontalière sud du Soudan/ouest de l'Éthiopie. Les efforts porteront essentiellement sur l'amélioration des opérations dans les zones à haut risque, notamment de l'accès aux populations difficiles à atteindre (par exemple en cas d'insécurité, de mouvements de population ou de populations vivant dans des zones reculées), ainsi que sur l'amélioration des performances de l'équipe des vaccinateurs. Les équipes actives en Éthiopie et dans le Sud du Soudan collaborent à la mise au point de microplans conjoints.
- Des activités analogues vont se dérouler dans la partie nord du Soudan, en particulier dans les provinces du Darfour.
- Tout doit être fait pour éviter toute nouvelle propagation du virus, notamment à la veille de la prochaine saison du Hadj.

### Népal

- En 2008, 5 cas ont été signalés (tous de type 3). Le séquençage génétique du cas récemment confirmé de poliomyélite révèle une nouvelle introduction d'un poliovirus indien de type 3 plutôt qu'une poursuite de la transmission à l'intérieur du pays de virus précédemment introduits au Népal. Le risque de l'importation de poliovirus à partir de l'Inde subsiste au Népal.
- Le VPO trivalent a été ajouté aux campagnes de vaccination contre la rougeole en septembre et une campagne de ratissage avec le VPOM3 aura lieu à la fin octobre.