L'Afghanistan en bref POLIO

2003

2004

Nombre total de cas de poliomyélite
2000 : 27 cas
2001 : 11 cas
2002 : 10 cas
2003 : 8 cas
2004 : 3 cas (au 29 septembre)

Priorités pour la période de juin à décembre

- Mener 2 Journées nationales de vaccination de haute qualité (JNV) en octobre et en novembre.

Situation en 2003

- L'Afghanistan a signalé le nombre le plus faible de cas jamais enregistrés en 2003 (8), malgré le retour de quelque 2 millions de réfugiés en 2002.
- Il ressort des données concernant la surveillance que l'état vaccinal s'est progressivement amélioré. Les principales préoccupations concernent les régions du sud (y compris la province de Kandahar). A fin 2003, 87 % des enfants du pays avaient reçu > 3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), alors que le taux n'était que de 68 % dans la région méridionale. C'est en raison de problèmes de sécurité dans cette région qu'il est difficile d'assurer une couverture vaccinale satisfaisante.
- Quatre des six régions de l'Afghanistan étaient exemptes de poliomyélite à fin 2003. Une zone de transmission autochtone à fin 2003 était la région méridionale (y compris la province de Kandahar).

Evolution de la situation en 2004

- L'Afghanistan est en passe d'interrompre la transmission du poliovirus d'ici fin 2004. Au 29 septembre, 3 cas seulement ont été confirmés depuis le début de l'année.
- Pour parvenir à l'éradication, il faudra mener des campagnes de vaccination de haute qualité pendant le reste de l'année, ce qui suppose une volonté politique durable, une surveillance adéquate et l'obligation de rendre des comptes afin que tous les enfants soient vaccinés au cours des campagnes.