


2003



2004

Nombre total de cas de poliomyélite

2000 : 2 cas
 2001 : 6 cas
 2002 : 3 cas
 2003 : 40 cas
 2004 : 20 cas (au 29 septembre)

Priorités pour la période de juin à décembre

- Intensifier les activités de vaccination afin de faire passer à plus de 90 % la proportion des enfants de moins de cinq ans vaccinés au cours des activités de vaccination supplémentaires.
- Organiser des Journées nationales de vaccination (JNV) de haute qualité synchronisées avec 22 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale en octobre et en novembre, ainsi qu'une autre JNV en décembre.

Situation en 2003

- Le nombre de cas de poliomyélite au Niger a plus que décuplé en 2003 par rapport à 2002 et avec 40 cas confirmés le Niger se situe au quatrième rang mondial. Des cas ont été signalés dans 6 régions sur 8.
- Le Niger semble avoir contribué à la réinfection du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.
- Il ressort des données concernant la surveillance que 52 % seulement des enfants avaient reçu ≥ 3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à fin 2003.

Evolution de la situation en 2004

- Le Niger a signalé 20 cas de poliovirus dans 4 des 8 régions du pays au 29 septembre.
- Le Niger a exporté le virus au Mali en juin 2004.
- Le nombre de campagnes antipoliomyélitiques est passé à 3 JNV complètes au début 2004 et il est prévu d'organiser 3 JNV supplémentaires en octobre, novembre et décembre. Il faut absolument améliorer la qualité des JNV prévues de façon à éviter la propagation du poliovirus au Niger.
- Un déficit immunitaire subsiste au Niger et il convient de le combler d'urgence.