Le Pakistan en bref POLIO



2003

2004

Nombre total de cas de poliomyélite
2000 : 199 cas
2001 : 119 cas
2002 : 90 cas
2003 : 103 cas
2004 : 30 cas (au 29 septembre)

Priorités pour la période de juin à décembre 2004

- Augmenter le nombre de femmes affectées aux équipes de vaccination et des agents de mobilisation dans la communauté
- Mener deux campagnes de haute qualité - Journées nationales de vaccination (JNV) - et deux Journées locales de vaccination (JLV)

Situation en 2003

- Le Pakistan avec 103 cas de poliomyélite vient au troisième rang des pays d'endémie en 2003 ; il s'agit du seul pays qui doit encore interrompre la transmission dans une zone géographique étendue pour une période prolongée.
- L'endémie de la poliomyélite se poursuit dans quatre grandes provinces – Province frontière du Nord-Ouest, Sindh, Baluchistan et Punjab.
- Afin de s'assurer que tous les enfants sont vaccinés au cours des campagnes de vaccination antipoliomyélitique et pour accéder à toutes les habitations, les autorités fédérales et provinciales ont cherché à faire en sorte que chaque équipe de vaccination comprenne des femmes et à mettre en place des équipes de soutien de district sous l'autorité des Nazims (dirigeants élus du district).
- A la suite de l'amélioration de la qualité des campagnes de vaccination, le nombre de cas de poliomyélite a baissé au second semestre 2003 malgré la saison de haute transmission.
- En septembre 2003, le Président Musharraf a demandé que soient organisées des réunions d'information mensuelles sur les progrès réalisés concernant l'éradication de la poliomyélite au Pakistan.

Evolution de la situation en 2004

- Avec seulement 30 cas enregistrés au 29 septembre 2004 (contre 66 pour la même période en 2003), le Pakistan est en passe d'interrompre la transmission d'ici fin 2004.
- La qualité des campagnes de vaccination antipoliomyélitique s'est améliorée de façon significative. Entre 2003 et 2004, le nombre moyen de doses de VPO administrées aux enfants de moins de cinq ans a augmenté de 25 à 30 % dans le Sindh, dans la Province frontière du Nord-Ouest et au Baluchistan, pour atteindre respectivement 11, 10 et 8 doses.
- A la suite de ces progrès, le début des campagnes de ratissage a été avancé. Les provinces du Sindh et du Punjab ont organisé des activités de ratissage supplémentaires en juin et la Province frontière du Nord-Ouest et le Baluchistan en août.
- La surveillance politique s'est accrue de façon substantielle grâce à une sensibilisation concertée à tous les niveaux.
- A la suite des récentes améliorations de la couverture lors des JNV, la transmission semble régresser. Le nombre de cas reste faible alors que la saison de haute transmission a déjà commencé.